XYZ_W=100.0 , 100.0 , 100.0

$A_2 = 2{,}5\ (a_2 - a_{2,n})\ Y$

$B_2 = 2{,}5\ B_c\ (b_2 - b_{2,n})\ Y$

$a_2 = a_{20}\ [\ (\ x - x_c\ )\ /\ y]$

$b_2 = b_{20}\ [\ z\ /\ y]$

$a_{20} = 1,\ \ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ \ B_c = 0{,}900$

$C_{AB2}=[A_2^2+B_2^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) C_{AB} in

linear colour space ($C_{AB,2}$, Y)

Illumin. E00, Y_W=100, Y_N=0



Name	Range	X_d	Y_d	Z_d	x_d	y_d	λ_d	λ_c
R_d	570_775	65.52	40.49	0.24	0.6165	0.381	598	489
Y_d	494_775	83.39	94.82	6.19	0.4522	0.5141	573	463
G_d	494_570	18.07	54.52	6.14	0.2295	0.6924	536	536c
C_d	380_570	34.67	59.7	99.95	0.1784	0.3072	489	598
B_d	380_494	16.8	5.37	94.0	0.1446	0.0462	463	573
M_d	570_494	82.12	45.67	94.05	0.3701	0.2058	536c	536
W_d	380_775	100.0	100.0	100.0	0.3333	0.3333	100%	
N_d	380_775	0.1	0.1	0.1	0.3332	0.3332	0%	
Z_d	380_775	18.0	18.0	18.0	0.3333	0.3333	18%	

$f(Y_{an})=\pm[1+10\ |Y_{an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

***Y* & Name**

Illuminant E00

Y_W=100, Y_N=0