$XYZ_{W,10}$=101.75 , 100.0 , 64.44

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ \ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ \ B_c = 1{,}300$

$C_{AB2,10}=[A_{2,10}{}^2+B_{2,10}{}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. P40, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0



Name	Range	$X_{d,10}$	$Y_{d,10}$	$Z_{d,10}$	$x_{d,10}$	$y_{d,10}$	λ_d	λ_c
R_d	569_775	71.44	43.5	0.12	0.6208	0.378	597	487
Y_d	492_775	91.3	93.44	3.86	0.484	0.4954	572	465
G_d	492_569	20.05	50.14	3.86	0.2708	0.677	535	535c
C_d	380_569	30.5	56.69	64.44	0.2011	0.3738	487	597
B_d	380_492	10.65	6.75	60.71	0.1363	0.0864	465	572
M_d	569_492	81.89	50.05	60.71	0.425	0.2598	535c	535
W_d	380_775	101.75	100.0	64.44	0.3822	0.3756	100%	
N_d	380_775	0.1	0.1	0.06	0.382	0.3755	0%	
Z_d	380_775	18.31	18.0	11.6	0.3822	0.3756	18%	

$f(Y_{10,an})=\pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant P40

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0