$XYZ_{W,10}$=116.54 , 99.99 , 26.13

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (\ x_{10} - x_c\ )\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ \ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ \ B_c = 3{,}700$

$C_{AB2,10}=[A_{2,10}{}^2+B_{2,10}{}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. P25, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=4



Name	Range	$X_{d,10}$	$Y_{d,10}$	$Z_{d,10}$	$x_{d,10}$	$y_{d,10}$	λ_d	λ_c
R_d	578_775	87.32	48.86	1.07	0.6362	0.3559	605	495
Y_d	500_775	112.78	94.86	2.25	0.5373	0.4519	580	473
G_d	500_578	30.23	50.1	2.25	0.366	0.6066	547	547c
C_d	380_578	33.99	55.24	26.13	0.2946	0.4787	495	605
B_d	380_500	8.54	9.23	24.95	0.1999	0.2161	473	580
M_d	578_500	91.09	54.0	24.95	0.5356	0.3175	547c	547
W_d	380_775	116.54	99.99	26.13	0.4802	0.412	100%	
N_d	380_775	4.66	3.99	1.04	0.4802	0.412	4%	
Z_d	380_775	20.97	17.99	4.7	0.4802	0.412	18%	

$f(Y_{10,an})=\pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant P25

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=4