XYZ$_{W,10}$=94.81 , 100.0 , 107.33

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 0{,}800$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. D65, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	561_775	59.84	39.12	0.21	0.6033	0.3944	593	482
Y_o	487_775	76.97	91.46	6.8	0.4392	0.5219	566	461
G_o	487_561	17.32	52.54	6.8	0.2259	0.6852	529	529c
C_o	380_561	35.16	61.07	107.33	0.1727	0.3	482	593
B_o	380_487	18.02	8.73	100.74	0.1413	0.0685	461	566
M_o	561_487	77.67	47.65	100.74	0.3435	0.2107	529c	529
W	380_775	94.81	100.0	107.33	0.3137	0.3309	100%	
N_o	380_775	0.09	0.1	0.1	0.3136	0.3308	0%	
Z_o	380_775	17.06	18.0	19.32	0.3137	0.3309	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant D65

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-1A

XYZ$_{W,10}$=96.72 , 99.99 , 81.41

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 1{,}000$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. D50, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	565_775	65.87	42.12	0.16	0.609	0.3894	594	484
Y_o	490_775	83.5	92.67	5.5	0.4596	0.51	568	463
G_o	490_565	17.81	50.74	5.5	0.2405	0.685	531	531c
C_o	380_565	31.04	58.07	81.41	0.182	0.3405	484	594
B_o	380_490	13.41	7.52	76.06	0.1382	0.0775	463	568
M_o	565_490	79.1	49.45	76.06	0.3865	0.2416	531c	531
W	380_775	96.72	99.99	81.41	0.3477	0.3595	100%	
N_o	380_775	0.09	0.09	0.08	0.3476	0.3594	0%	
Z_o	380_775	17.41	17.99	14.65	0.3477	0.3595	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant D50

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-2A

XYZ$_{W,10}$=101.75 , 100.0 , 64.44

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 1{,}300$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. P40, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	575_775	71.44	43.5	0.12	0.6208	0.378	597	487
Y_o	492_775	91.3	93.44	3.86	0.484	0.4954	572	465
G_o	492_569	20.05	50.14	3.86	0.2708	0.677	535	535c
C_o	380_569	30.5	56.69	64.44	0.2011	0.3738	487	597
B_o	380_492	10.65	6.75	60.71	0.1363	0.0864	465	572
M_o	569_492	81.89	50.05	60.71	0.425	0.2598	535c	535
W	380_775	101.75	100.0	64.44	0.3822	0.3756	100%	
N_o	380_775	0.1	0.1	0.06	0.382	0.3755	0%	
Z_o	380_775	18.31	18.0	11.6	0.3822	0.3756	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant P40

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-3A

XYZ$_{W,10}$=111.15 , 99.99 , 35.19

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 2{,}500$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. A00, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	575_775	76.86	41.39	0.07	0.6496	0.3498	606	493
Y_o	498_775	105.7	395.07	2.27	0.5206	0.4681	577	469
G_o	498_575	29.08	53.88	2.27	0.3412	0.6321	546	546c
C_o	380_575	34.5	58.8	35.19	0.2685	0.4576	493	606
B_o	380_498	5.63	5.12	32.99	0.1288	0.117	469	577
M_o	575_498	82.28	46.31	32.99	0.5091	0.2865	546c	546
W	380_775	111.15	99.99	35.19	0.4511	0.4059	100%	
N_o	380_775	0.11	0.09	0.03	0.451	0.4057	0%	
Z_o	380_775	20.0	18.0	6.33	0.4511	0.4059	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant A00

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-4A

XYZ$_{W,10}$=99.99 , 99.99 , 100.0

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 0{,}900$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. E00, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	564_775	66.2	42.43	0.2	0.6082	0.3898	594	482
Y_o	487_775	83.17	92.54	6.46	0.4565	0.5079	568	459
G_o	487_564	17.17	50.3	6.46	0.2322	0.6803	530	530c
C_o	380_564	33.98	57.76	100.0	0.1772	0.3012	482	594
B_o	380_487	17.01	7.65	93.74	0.1436	0.0646	459	568
M_o	564_487	83.01	49.89	93.74	0.3662	0.2201	530c	530
W	380_775	99.99	99.99	100.0	0.3333	0.3333	100%	
N_o	380_775	0.09	0.09	0.1	0.3331	0.3332	0%	
Z_o	380_775	17.99	17.99	18.0	0.3333	0.3333	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant E00

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-5A

XYZ$_{W,10}$=97.28 , 99.99 , 116.14

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 0{,}700$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. C00, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	561_775	61.15	40.24	0.23	0.6017	0.3959	593	481
Y_o	486_775	77.82	90.55	6.36	0.4453	0.5182	567	461
G_o	486_561	16.86	50.51	6.36	0.2286	0.685	530	530c
C_o	380_561	36.32	59.95	116.14	0.1709	0.2822	481	593
B_o	380_486	19.65	9.64	110.01	0.141	0.0692	461	567
M_o	561_486	80.62	49.68	110.01	0.3354	0.2067	530c	530
W	380_775	97.28	99.99	116.14	0.3103	0.319	100%	
N_o	380_775	0.09	0.09	0.11	0.3102	0.3189	0%	
Z_o	380_775	17.51	18.0	20.9	0.3103	0.319	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant C00

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-6A

XYZ$_{W,10}$=102.37 , 99.99 , 81.25

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 1{,}000$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. P00, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	567_775	69.98	42.93	0.16	0.6189	0.3796	597	484
Y_o	489_775	88.89	93.25	5.23	0.4743	0.4976	571	461
G_o	489_567	19.1	50.52	5.23	0.2551	0.6748	533	533c
C_o	380_567	32.59	57.26	81.25	0.1904	0.3346	484	597
B_o	380_489	13.68	6.94	76.17	0.1414	0.0717	461	571
M_o	567_489	83.47	49.67	76.17	0.3787	0.2373	533c	533
W	380_775	102.37	99.99	81.25	0.3609	0.3525	100%	
N_o	380_775	0.1	0.09	0.08	0.3608	0.3524	0%	
Z_o	380_775	18.42	18.0	14.62	0.3609	0.3525	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant P00

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-7R

XYZ$_{W,10}$=97.65 , 100.0 , 118.42

$A_{2,10} = 2{,}5\ (a_{2,10} - a_{2,n,10})\ Y_{10}$

$B_{2,10} = 2{,}5\ B_c\ (b_{2,10} - b_{2,n,10})\ Y_{10}$

$a_{2,10} = a_{20}\ [\ (x_{10} - x_c)\ /\ y_{10}]$

$b_{2,10} = b_{20}\ [\ z_{10}\ /\ y_{10}]$

$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0{,}4$

$x_c = 0{,}110,\ B_c = 0{,}700$

$C_{AB2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$

6 *Ostwald* colours (o)

of maximum (m) $C_{AB,10}$ in

linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})

Illumin. Q00, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

Name	Range	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	λ_d	λ_c
R_o	561_775	60.93	39.91	0.23	0.6028	0.3948	593	481
Y_o	486_775	77.48	90.9	6.21	0.4437	0.5206	566	459
G_o	486_561	16.74	51.18	6.21	0.2258	0.6903	530	530c
C_o	380_561	36.9	60.28	118.42	0.1711	0.2796	481	593
B_o	380_486	20.35	9.29	112.44	0.1432	0.0654	459	566
M_o	561_486	81.1	49.01	112.44	0.3343	0.202	530c	530
W	380_775	97.65	100.0	118.42	0.3089	0.3163	100%	
N_o	380_775	0.09	0.1	0.11	0.3088	0.3162	0%	
Z_o	380_775	17.57	18.0	21.31	0.3089	0.3163	18%	

$f(Y_{10,an}) = \pm[1+10\ |Y_{10,an}|^n]$

n increases to 1 for:

1. decreasing of the contrast *C*
2. adjacent compared to separate colours.

Parameter:

Y_{10} & Name

Illuminant Q00

$Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=0

BEQ50-8A