Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/hgys.htm
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20241201-hgy1/hgy1l0na.txt /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{ab}(L_r,m)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{L_r^m-L_r^{-m}}{L_r^m+L_r^{-m}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(L_r,m)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{dF_{ab}(L_r,m)}{dL}=\frac{4bmL_u}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \quad \begin{matrix} dL_r=dL/L_u \\ dF_{ab}(L_r,m)=1 \end{matrix} \quad [6]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bmL_uL}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \qquad dL=\frac{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2}{4bmL_u} \quad [7]$$

hgy10−1n eer10−1n eeo41−8n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{cb}(L_r,n)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{L_r^n-L_r^{-n}}{L_r^n+L_r^{-n}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(L_r,n)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{dF_{cb}(L_r,n)}{dL}=\frac{4bnL_u}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \quad \begin{matrix} dL_r=dL/L_u \\ dF_{cb}(L_r,n)=1 \end{matrix} \quad [6]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bnL_uL}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \qquad dL=\frac{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2}{4bnL_u} \quad [7]$$

hgy10−2n eer10−2n eeo41−8n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{ab}(x_r,a)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{e^{x_r/a}-e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{a[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bm}{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2} \qquad dL=\frac{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2L}{4bm} \quad [7]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bm}{[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \qquad dL=\frac{[L_r^m+L_r^{-m}]^2L}{4bm} \quad [8]$$

hgy11−1n eer11−1n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{cb}(x_r,a)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{e^{x_r/c}-e^{-x_r/c}}{e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{c[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bn}{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2} \qquad dL=\frac{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2L}{4bn} \quad [7]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bn}{[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \qquad dL=\frac{[L_r^n+L_r^{-n}]^2L}{4bn} \quad [8]$$

hgy11−2n eer11−2n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{ab}(L_r,m)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{L_r^m-L_r^{-m}}{L_r^m+L_r^{-m}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(L_r,m)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bmL_uL}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \qquad dL=\frac{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2}{4bmL_u} \quad [7]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4L}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2L_u}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2}{4} \quad [8]$$

hgy10−3n eer10−3n eeo41−8n,ch

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{cb}(L_r,n)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{L_r^n-L_r^{-n}}{L_r^n+L_r^{-n}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(L_r,n)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bnL_uL}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \qquad dL=\frac{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2}{4bnL_u} \quad [7]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4L}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2L_u}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2}{4} \quad [8]$$

hgy10−4n eer10−4n eeo41−8n,ch

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{ab}(x_r,a)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{e^{x_r/a}-e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{a[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bm}{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2} \qquad dL=\frac{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2L}{4bm} \quad [7]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bm}{[L_r^{2m}+2+L_r^{-2m}]} \qquad dL=\frac{[L_r^{2m}+2+L_r^{-2m}]L}{4bm} \quad [8]$$

hgy11−3n eer11−3n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{cb}(x_r,a)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{e^{x_r/c}-e^{-x_r/c}}{e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{c[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bn}{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2} \qquad dL=\frac{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2L}{4bn} \quad [7]$$

$$\frac{L}{dL}=\frac{4bn}{[L_r^{2n}+2+L_r^{-2n}]} \qquad dL=\frac{[L_r^{2n}+2+L_r^{-2n}]L}{4bn} \quad [8]$$

hgy11−4n eer11−4n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{ab}(L_r,m)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{L_r^m-L_r^{-m}}{L_r^m+L_r^{-m}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(L_r,m)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4L}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2L_u}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2}{4} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L=L_u \\ x_r=0 \end{cases} \qquad \frac{dL}{dL_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L=L_u \\ x_r=0 \end{cases} \quad [9]$$

hgy10−5n eer10−5n eeo41−8n,ch

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{cb}(L_r,n)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{L_r^n-L_r^{-n}}{L_r^n+L_r^{-n}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(L_r,n)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4L}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2L_u}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2}{4} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L=L_u \\ x_r=0 \end{cases} \qquad \frac{dL}{dL_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L=L_u \\ x_r=0 \end{cases} \quad [9]$$

hgy10−6n eer10−6n eeo41−8n,ch

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{ab}(x_r,a)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{e^{x_r/a}-e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{a[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2L}{4L_u} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{[L_r^m+L_r^{-m}]^2}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{[L_r^m+L_r^{-m}]^2L}{4L_u} \quad [9]$$

hgy11−5n eer11−5n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{cb}(x_r,a)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{e^{x_r/c}-e^{-x_r/c}}{e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{c[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2L}{4L_u} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{[L_r^n+L_r^{-n}]^2}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{[L_r^n+L_r^{-n}]^2L}{4L_u} \quad [9]$$

hgy11−6n eer11−6n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{ab}(L_r,m)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{L_r^m-L_r^{-m}}{L_r^m+L_r^{-m}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(L_r,m)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4L}{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2L_u}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{L_r[L_r^m+L_r^{-m}]^2}{4} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L_r=1 \\ x_r=0 \end{cases} \qquad \frac{dL}{dL_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L_r=1 \\ x_r=0 \end{cases} \quad [9]$$

hgy10−7n eer10−7n eeo41−8n,ch

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Gleichungen mit Potenzfunktionen

$$F_{cb}(L_r,n)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{L_r^n-L_r^{-n}}{L_r^n+L_r^{-n}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(L_r,n)}{dL_r}=\frac{4bm}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4L}{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2L_u}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{L_r[L_r^n+L_r^{-n}]^2}{4} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L_r=1 \\ x_r=0 \end{cases} \qquad \frac{dL}{dL_u}=1 \text{ für } \begin{cases} L_r=1 \\ x_r=0 \end{cases} \quad [9]$$

hgy10−8n eer10−8n eeo41−8n,ch

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{ab}(x_r,a)=b\tanh(x_r/a)=b\frac{e^{x_r/a}-e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r<=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{ab}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{a[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ m=1/(\ln(10)a) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{[e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}]^2L}{4L_u} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{L_r^{2m}+2+L_r^{-2m}}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{(L_r^{2m}+2+L_r^{-2m})L}{4L_u} \quad [9]$$

hgy11−7n eer11−7n

Achromatisches Sehen mit relativer Leuchtdichte
Mathematische Hyperbel- und Potenzfunktionen

$$F_{cb}(x_r,a)=b\tanh(x_r/c)=b\frac{e^{x_r/c}-e^{-x_r/c}}{e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}} \quad \begin{matrix} x_r=\log(L_r) \\ L_r=L/L_u \\ x_r>=0 \end{matrix} \quad [1]$$

$$\frac{dF_{cb}(x_r,a)}{dx_r}=\frac{4b}{c[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2} \quad \begin{matrix} x_r=\ln L_r/\ln(10) \\ dx_r/dL_r=1/(\ln(10)L_r) \\ n=1/(\ln(10)c) \end{matrix} \quad [5]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{[e^{x_r/c}+e^{-x_r/c}]^2L}{4L_u} \quad [8]$$

$$\frac{L/dL}{(L/dL)_u}=\frac{4}{L_r^{2n}+2+L_r^{-2n}}; \quad \frac{dL}{dL_u}=\frac{(L_r^{2n}+2+L_r^{-2n})L}{4L_u} \quad [9]$$

hgy11−8n eer11−8n